TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

▼CABLIVI® 10 mg

polvo para solución inyectable (caplacizumab)

- Lleve siempre consigo esta tarjeta mientras esté en tratamiento con Cablivi.
- Muestre esta tarjeta a cualquier profesional sanitario (médico, dentista o cirujano) antes de cualquier tratamiento o intervención médica.
- Lea el prospecto detenidamente.
- Póngase inmediatamente en contacto con su médico si se produce una hemorragia prolongada o excesiva o algún síntoma inusual.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Diciembre 2019

▼ *Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento*

Nombre del paciente

Persona de contacto en caso de urgencia: Nombre y Nº de teléfono

Para obtener más información o en caso de urgencia, póngase en contacto con mi médico

Nombre y Teléfono del médico

Información del tratamiento (a rellenar por su médico)

El paciente comenzó a tomar **CABLIVI** (caplacizumab) para púrpura trombocitopénica trombótica adquirida (PTTa) el:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: ***https://www.notificaRAM.es***

SANOFI GENZYME

GZES.CAPL.20.01.0005 Enero de 2020

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES SANITARIOS

- Cablivi actúa sobre el dominio A1 del factor von Willebrand (FvW).
- El tratamiento con este medicamento puede aumentar el riesgo de hemorragia.
- Se debe vigilar estrechamente cualquier signo o síntoma indicativo de hemorragia.
- En caso de hemorragia activa clínicamente significativa, se debe interrumpir el tratamiento con Cablivi.
- Si es necesario, se puede considerar el uso de concentrado de factor von Willebrand para corregir la hemostasia.
- Debido a un posible aumento del riesgo de hemorragia, el tratamiento concomitante con anticoagulantes orales, dosis altas de heparina, agentes antiplaquetarios o heparinas de bajo peso molecular, requieren una evaluación beneficio/riesgo y una estrecha monitorización clínica.
- El tratamiento con Cablivi debe suspenderse al menos 7 días antes de una cirugía electiva.

Para obtener más información acerca del riesgo de hemorragia asociado a caplacizumab y su manejo clínico, consulte la ficha técnica de Cablivi disponible en el Centro de información online de medicamentos de la AEMPS (https://cima.aemps.es)